

Микоплазменная пневмония у детей

Что известно о *Mycoplasma Pneumoniae*, которая её вызывает?

- ☐ Передается от человека к человеку воздушно-капельным путем
- ☐ Инкубационный период примерно 23 дня
- ☐ Наиболее часто поражает детей старше 5 лет
- ☐ Бессимптомное носительство является распространенным явлением

Микоплазменную пневмонию называют «walking pneumonia», что в переводе «никуда не торопящаяся»

Главное отличие — слабо выраженная интоксикация!

- ☐ Температура обычно до 38
 - ☐ Сухой кашель может быть навязчивым, приступообразным, как при коклюше, иногда с затруднением вдоха
 - ☐ Без лечения может продолжаться несколько недель а то и месяцев. Возможны рецидивы кашля после выздоровления
 - ☐ Нет выраженного ослабления дыхания. Простукивание легких также не дает особой информации.
 - ☐ Нередко отмечают увеличение шейных лимфоузлов, появление сыпи на теле, увеличение печени и селезенки, боли в суставах, головной боли, что может ввести в заблуждение при диагностике.
- Не занимайтесь самолечением. Необходима консультация врача.

Рост заболеваемости микоплазменная пневмония у детей



Лихорадка



Кашель



Головная боль



Общая
утомляемость



Боль в области
грудной клетки



Тяжесть
при дыхании